



Ang Pagbabago sa Johnson & Johnson na Bakuna

Noong 4/23/21, tinaas ng CDC at FDA ang 11-araw na paghinto sa paggamit ng bakunang Johnson & Johnson (J&J) at inirekumenda na muling simulan ang paggamit nito sa U.S.

Sa pagsusuri ng kaligtasan ng J&J, 15 mga kaso ng mga bihirang pamumuo ng dugo na may mababang mga platelet ang nakilala mula sa halos 8 na Milyon na dosis na ibinigay sa U.S.

Ang mga bihirang pamumuo ng dugo na ito na may mababang platelet ay nakalista na ngayon bilang isang potensyal na peligro sa tatak ng bakuna at mga fact sheet.

Ang peligro para sa mga bihirang pamumuo ng dugo na may mababang mga platelet ay halos 2 sa bawat milyong taong nabakunahan ng J&J.

Ang kaligtasan sa bakuna ay isang prioridad para sa lahat. Ipinakita ang paghinto kung paano maingat na binabantayan ng FDA at ang CDC ang mga bakuna. Pinatunayan din nito kung gaano kabilis ang kanilang pagsisiyasat sa mga seryosong kaganapan.

Ang mga opisyal ng pederal, estado at lokal na kalusugan ay tiwala na ang J&J ay ligtas at epektibo sa pag-iwas sa COVID-19. Ang mga benepisyong ng J&J ay mas higit pa sa kilala at mga potensyal na peligro sa sinumang 18 taong gulang pataas.

Sa ngayon, nakapagbigay kami ng higit sa 33,000 na dosis ng J&J sa mga residente

ng SF. Lilinawin ng Lungsod sa sf.gov/fil/vaccine-sites kung aling mga bakuna ang magagamit sa mga lugar ng bakunang pinapatakbo ng Lungsod. Kung nasa isang lokasyon ka na nagbibigay ng J&J, makakatanggap ka ng impormasyon at maaari kang magtanong.

Bagaman mababa ang peligro, kung natanggap mo ang bakunang J&J sa huling 3-4 na linggo, abangan ang mga posibleng sintomas ng pamumuo ng dugo na may mababang mga platelet. Humingi kaagad ng pangangalagang medikal kung nagkakaroon ka ng isa o higit pa sa mga sintomas na ito:

- Malubha o paulit-ulit na sakit ng ulo o malabo ang paningin
- Kakulangan ng hininga
- Pananakit ng dibdib
- Pananakit ng likod
- Pananakit o pamamaga ng paa
- Patuloy na pananakit ng tiyan
- Pagduduwal at pagsusuka
- Madaling magkapasa o maliliit na mga batik ng dugo sa ilalim ng balat na lampas sa lugar ng pag-iiniksyon

Kung mas matagal kang maghihintay para mabakunahan, mas malaki ang peligro mong makakuha ng COVID-19. Ang panganib na namamatay sa COVID ay totoo.

