



強生 (J&J) 疫苗 社區資訊更新

美國疾病控制及預防中心 (CDC) 和聯邦食品及藥物管理局 (FDA) 於2021年4月23日，解除了對強生 (Johnson & Johnson) 疫苗長達11日的暫停使用禁令，並且建議在美國境內恢復接種。

根據對強生疫苗 (J&J) 安全使用的研究，在全國接近八百萬個疫苗接種個案中，出現了十五個罕見的低血小板血栓病例。

這種罕見的低血小板血管阻塞的風險，已經被列入疫苗的標籤和資料說明。

在每二百萬位接種強生疫苗 (J&J) 的人之中，大概會有兩人出現這種罕見的低血小板血栓的反應。

疫苗安全是每個人的首要考慮。這次暫停接種顯示聯邦食品及藥物管理局 (FDA) 和疾病控制及預防中心 (CDC) 對監管疫苗的謹慎。亦顯示他們對嚴重事件的迅速應變。

聯邦、州府和地方政府官員對強生疫苗 (J&J) 在預防感染新冠病毒 (COVID-19) 的安全和有效性具有信心。對十八歲或以上人士，強生疫苗的好處遠超過它所帶來已知的風險。

直至目前為止，我們已經為超過三萬三千名三藩市民眾接種了強生疫苗 (J&J)。市府會在 sf.gov/zh-hant/vaccine-sites 網站上列明，每個市府營運的疫苗接種站所提供的疫苗種類。如果您正身處提供強生疫苗 (J&J) 的接種站，您會得到通知並可查詢有關資料。

縱使風險甚低，如果您在過去3至4週曾接種強生疫苗 (J&J)，請留意是否有血栓的症狀。一旦發現以下一或多個症狀，請立即求醫：

- 嚴重或持續性的頭痛、視力模糊
- 氣促
- 胸痛
- 背、腿疼痛或腫脹
- 持續性肚痛
- 噁心和嘔吐
- 接種部位容易發現瘀青或出現皮下小血點

等候接種疫苗的時間越長，您就越容易增加感染新冠病毒 (COVID-19) 的風險。感染後致死的風險仍然確實存在。

